



宣導資料

115年01月刊

認識職業性氣喘

因暴露於工作環境中，可經空氣傳播之灰塵、氣體、蒸氣或汽化金屬導致可逆性呼吸道狹窄

● 症狀

較輕症狀常有鼻炎、眼睛受刺激，較重症者會出現呼吸急促、胸悶、咳嗽等症狀，多於暴露後數月至數年內發生

● 誘發因子與暴露職業

高分子量致敏原(多為有機物)



動物性產物

動物的皮屑、毛髮、唾液或尿中的蛋白質

實驗室工作者、獸醫、農夫、昆蟲學者等



植物性產物

如穀塵、麵粉、麥片、咖啡豆、棉花等

烘焙師傅、茶業工作者、煙草業、釀造業、印刷業及橡膠者等




生物性產物

如清潔用品中的酵素、蛋白酶、脂酶

清潔劑業、塑膠業、藥品業、蝦蟇業、蠶絲產業等

低分子量致敏原



化學物質

如福爾馬林、塑料、人造樹脂、絕緣材料、黏著劑等

油漆業、塑膠業、電子業、美容業、汽車噴漆業等



金屬

如鉑鹽、硫酸鎳、鉻

金屬加工業



環境性物質

例如煙霧、氯氣或二氧化硫

鑄造業

